Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік

Сатып алудың нөмірі:	№ 3026627-1
Сатып алудың атауы:	Тауар
Лоттың нөмірі:	№ 23991608-ОК1
Лоттың атауы :	Дезинфекциялау құралы
Лоттың сипаттауы:	аммоний негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дезинфекциялау құралы. Толық талаптар техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	150
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түркісіб ауданы Папанин к., 220
Жеткізу мерзімі:	Ағымдағы жылдың ішінде Тапсырыс берушінің сұранымы бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде 2019 жылдың 31 желтоқсанына дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:

Антисептический препарат для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых. Состав и описание: Прозрачный раствор, практически свободный от видимых частиц, со слабым специфическим запахом. 100 мл препарат содержат: Октенидина дигидрохлорида ± 0,1 г; Феноксиэтанола ± 2 г; Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин, натрия D-глюконат, глицерол 85%, натрия хлорид, вода очищенная, в том числе глицерин. Микробиологическая активность: Активен в отношении грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе: Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp. (в том числе Staphylococcus aureus), Enterococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Shigella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, грибы, в том числе Ascomycota, Trichophyton spp. и Microsporum spp., Candida albicans, вирусы, в том числе вируса простого герпеса, вируса гепатита B, C и D, вируса иммунодефицита человека, штаммы Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma spp. и Ureaplasma spp., обладает активностью в отношении штаммов резистентных к действию других химиотерапевтических препаратов. Средство должно быть расфасовано во флаконы объемом не менее 250 мл. Область применения. Педиатрия: - обработка слизистых оболочек новорожденных и младенцев; - обработка кожи новорожденных и младенцев; - обработка пупочной ранки; - лечение пупочной раны при гнойных выделениях. Хирургия: - обработка контаминированных травматических ран (резаные, колотые, колото-резаные, рваные, укушенные, рубленые, размозжённые, ушибленные, огнестрельные); - обработка пролежней; - обработка язв (включая гангрену); - санитарная обработка и лечение инфицированных ссадин; - обработка послеоперационных швов; - обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи до, во время и после проведения хирургических, диагностических и других медицинских процедур; - обработка открытых операционных ран; - обработка гнойно-воспалительных процессов мягких тканей: декубитальные язвы, «диабетическая стопа», открытые абсцессы, открытые фистулы, гнойные затеки, открытые «карманы». Пластическая хирургия: - обработка ран; - обработка инфицированных ран; - обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи до и после проведения хирургических вмешательств; - применяется при противопоказаниях к спиртосодержащим продуктам. Акушерство и гинекология: - санация влагалища до и после медицинских процедур; - для вульвовагиниты, вызванных бактериями; - вульвиты, вызванные бактериями; - вагиниты, вызванные бактериями; - дрожжевые инфекции (вагинальный кандидоз), вызванные бактериями. Проктология: - пред-, интра- и послеоперационная обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи; Урология: - антисептическая обработка поверхностных органов мочеполовой системы перед проведением инвазивных процедур или перед трансуретральной катетеризацией. Дерматология, лечение: - акне; - дерматофиты; - гнойничковые заболевания кожи (в том числе вызванных MRSA); - лабиальный герпес; - микозы стоп; - солнечные ожоги; - отрубевидный лишай; Отоларингология: - обработка слизистых оболочек ротовой полости до и после проведения хирургических вмешательств; - обработка ротовой полости у пациентов, являющихся переносчиками золотистого стафилококка, а также у лиц, контактирующих с ними (медицинский персонал, родственники). Стоматология: - пародонтозы; - профилактика образования бактериального зубного налета в полости рта; - обработка язвочек в полости рта; - стоматиты; - гингивиты; - молочница у детей вызванная дрожжевыми грибками. Комбустиология: - обработка термических ожогов (глубокие и поверхностные). Условия хранения: При температуре -5 °C - +25 °C, в защищённом от света месте, недоступном для детей. Срок годности: не менее 5 лет. После того как бутылка была открыта, раствор стабилен не менее 3 лет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация

Номер закупки:	№ 3026627-1
Наименование закупки:	Товар
Номер лота:	№ 23991608-ОК1
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Описание лота:	на основе амония
Дополнительное описание лота:	Средство дезинфицирующее. Полное требование согласно технической спецификации
Количество:	150
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Туркcибский район ул. Папанина, 220
Срок поставки:	В течение текущего года по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2019 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):	Антисептический препарат для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых. Состав и описание: Прозрачный раствор, практически свободный от видимых частиц, со слабым специфическим запахом. 100 мл препарат содержат: Октенидина дигидрохлорида ± 0,1 г; Феноксиэтанола ± 2 г; Вспомогательные вещества: кокамидопропилбетаин, натрия D-глюконат, глицерол 85%, натрия хлорид, вода очищенная, в том числе глицерин. Микробиологическая активность: Активен в отношении грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе: Streptococcus spp. (в том числе Streptococcus pneumoniae), Staphylococcus spp. (в том числе Staphylococcus aureus), Enterococcus spp., Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Shigella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, грибы, в том числе Ascomycota, Trichophyton spp. и Microsporum spp., Candida albicans, вирусы, в том числе вируса простого герпеса, вируса гепатита B, C и D, вируса иммунодефицита человека, штаммы Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma spp. и Ureaplasma spp., обладает активностью в отношении штаммов резистентных к действию других химиотерапевтических препаратов. Средство должно быть расфасовано во флаконы объемом не менее 250 мл. Область применения. Педиатрия: - обработка слизистых оболочек новорожденных и младенцев; - обработка кожи новорожденных и младенцев; - обработка пупочной ранки; - лечение пупочной раны при гнойных выделениях. Хирургия: - обработка контаминированных травматических ран (резаные, колотые, колото-резаные, рваные, укушенные, рубленые, размозжённые, ушибленные, огнестрельные); - обработка пролежней; - обработка язв (включая гангрену); - санитарная обработка и лечение инфицированных ссадин; - обработка послеоперационных швов; - обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи до, во время и после проведения хирургических, диагностических и других медицинских процедур; - обработка открытых операционных ран; - обработка гнойно-воспалительных процессов мягких тканей: декубитальные язвы, «диабетическая стопа», открытые абсцессы, открытые фистулы, гнойные затеки, открытые «карманы». Пластическая хирургия: - обработка ран; - обработка инфицированных ран; - обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи до и после проведения хирургических вмешательств; - применяется при противопоказаниях к спиртосодержащим продуктам. Акушерство и гинекология: - санация влагалища до и после медицинских процедур; - для вульвовагиниты, вызванных бактериями; - вульвиты, вызванные бактериями; - вагиниты, вызванные бактериями; - дрожжевые инфекции (вагинальный кандидоз), вызванные бактериями. Проктология: - пред-, интра- и послеоперационная обработка слизистых оболочек и близлежащей кожи; Урология: - антисептическая обработка поверхностных органов мочеполовой системы перед проведением инвазивных процедур или перед трансуретральной катетеризацией. Дерматология, лечение: - акне; - дерматофиты; - гнойничковые заболевания кожи (в том числе вызванных MRSA); - лабиальный герпес; - микозы стоп; - солнечные ожоги; - отрубевидный лишай; Отоларингология: - обработка слизистых оболочек ротовой полости до и после проведения хирургических вмешательств; - обработка ротовой полости у пациентов, являющихся переносчиками золотистого стафилококка, а также у лиц, контактирующих с ними (медицинский персонал, родственники). Стоматология: - пародонтозы; - профилактика образования бактериального зубного налета в полости рта; - обработка язвочек в полости рта; - стоматиты; - гингивиты; - молочница у детей вызванная дрожжевыми грибками. Комбустиология: - обработка термических ожогов (глубокие и поверхностные). Условия хранения: При температуре -5 °C - +25 °C, в защищённом от света месте, недоступном для детей. Срок годности: не менее 5 лет. После того как бутылка была открыта, раствор стабилен не менее 3 лет.