«MICROHIM» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «MICROHIM»

050000, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Маметовой к-сі, 72-35
БИН 041240008933
тел. +7 (727) 221 49 24
факс: +7 (727) 242 65 26
E-mail: 572202@mail.ru

ТОО «MICROHIM»

050000, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Маметовой, 72-35.
БИН 041240008933
тел. +7 (727) 221 49 24
факс: +7 (727) 242 65 26
E-mail: 572202@mail.ru

Исх. № _79_
от 04.08.2021г.

ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 3»
акимата города Нур-Султан
Директору Данбаевой Жулдыз Сейткамзиновне

Настоящим письмом выражаем свое несогласие в необоснованном отклонении ТОО «Microhim» в конкурсе № 5946123-1 и уведомляем Вас о грубых нарушениях подведения итогов в данной закупки по лоту: 44388478-ОК1.

Считаем, что действия комиссии при принятии окончательного решения не объективны и нарушают законность проведения данного конкурса, а именно:

Номер конкурса: № 5946123-1

Номер лота	Техническая характеристика Заказчика	Техническая характеристика потенциального Поставщика	Причина отклонения	Решение комиссии Заказчика:	Прикрепленные документы, подтверждающие правомерность потенциального Поставщика
44388478-ОК1	Спрей антисептический представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом спирта. В качестве действующих веществ средство содержит пропанол-2 63%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,25%, а также воду. Срок годности средства 2 года. Средство упаковано в полиэтиленовые флаконы вместимостью 500 мл. Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (включая аденовирусы, различные штаммы вируса гриппа, включая птичьего и свиного, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы,	Дезинфицирующее средство «Изосепт» кожный антисептик, представляет собой готовый к применению прозрачный бесцветный раствор с характерным запахом спирта. Средство содержит спирт изопропиловый (пропанол-2) 63% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 0,25%, в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, вода, в том числе увлажняющие кожу компоненты. Срок годности средства составляет 3 года. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, различные штампы	Не соответствие потенциального поставщика требованиям технической спецификации в части: - Не соответствие потенциального поставщика технической спецификации товара;	Не обосновано	Методические рекомендации, в которых указан диапазон требуемых показателей: в МУ указано, что пропанол-2 (изопропиловый спирт) 63% и в промежутке 65,0±3,0% в таблице на стр. 7) и алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) 0,25%, и в промежутке 0,2±0,05 в таблице на стр. 7) и т.д. ТОО «Microhim» является сам заводом-производителем и поставщиком данной продукции, и были представлены документы, в которых это указано: Свидетельство о регистрации, Сертификат соответствия, Сертификат СТ.КЗ, Прокол санитарно-микробиологического исследования на

	вирусы полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекции и др.) и фунгицидное (в том числе в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) действие. По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство относится к 5 классу практически нетоксичных соединений. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС - 1,0 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности). ПДК в воздухе рабочей зоны пропанола-2 - 10 мг/м, 3 класс опасности (пары). Предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного поля - для обработки локтевых сгибов доноров - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов. Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров	вируса гриппа (H5N1, A/H1N1), парагриппа, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, атипичной пневмонии, ВИЧ-инфекция, аденовирус, энтеровирус, ротавирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ (ГОСТ 12.1.007- 76) при парентеральном введении относятся к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К.Сидорова; пары средства в насыщающих концентрациях по степени летучести мало опасны (4 класс опасности). Средство не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС составляет 1 мг/м3 (аэрозоль). ПДК в воздухе рабочей зоны изопропанола (пропанола-2) составляет 10 мг/м3 (аэрозоль). Предназначено для применения в лечебно-профилактических организациях любого профиля, в том числе стоматологических, офтальмологических, детских стационарах, акушерских клиниках, учреждениях родовспоможения (включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в инфекционных очагах, в зонах чрезвычайных ситуаций; в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на			туберкулоцидную активность.

	и пункцией суставов: кожу двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после окончания обработки - 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье. Обработка инъекционного поля: - кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки - 15 секунд. - проводят способом орошения кожи в месте инъекции до полного увлажнения с последующей выдержкой после орошения - 15 секунд. Массовая доля пропанола-2, %-63,0 ±3,15 Массовая доля ЧАС, %-0,25 ±0,01 pH средства-4,5 - 7,5	коммунальных объектах (офисы, парикмахерские, гостиницы, общежития, сауны, салоны красоты, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности, населением в быту: - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций в лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических клиниках), приеме родов в родильных домах и др.; - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; - для обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др.; - для обеззараживания, обезжиривания и обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов в лечебно - профилактических учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в учреждениях соцобеспечения (домах престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных учреждениях, пенитенциарных учреждениях, в зонах чрезвычайных ситуаций; Обработка операционного поля, в том числе перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин. Обработка локтевых сгибов доноров: кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно			

		смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 мин. Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки: кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством; время выдержки после окончания обработки - 15 секунд. Упаковка: Флакон 500 мл			

Просим пересмотреть протокол итогов № 5946123-ОК1 от 30.07.2021г. по лоту: 44388478-ОК1, с учетом указанных обоснований и допустить дальнейшее участие в данном конкурсе отечественного производителя ТОО «Microhim».

Генеральный директор **Пономарева Т.С.**