Ауылшаруашылық жануарларының (ірі қара мал,қой, жылқы, шошқа) сальмонеллезіне қарсы поливалентті вакцинаны пайдалану жөніндегі

РК-ВП-1-4279-20

НҰСҚАУ

1. Жалпы ережелер

1.1 Ауылшаруашылық жануарларының (ірі қара мал,қой, жылқы, шошқа**)** сальмонеллезіне қарсы поливалентті вакцинаны (бес штамм-сероварынан Salmonella dublin 12, Salmonella typhimurium – 09, S. abortusovis К-8, S. abortusequi Б-41, Salmonella choleraesuis В-17 тұратын) құрғақ тірі вакцина сыртқы көрінісі бойынша сыртқы көрінісі бойынша сұйық немесе лиофильді құрғатылған, ұсақ саңылаулы массалы ақшыл немесе сұрғылт сарғыш түсті.

Препарат хлорлы натридің физиологиялық ерітіндісінде немесе қайнаған суда жеңіл ериді (суспензияланады).

1.2. Вакцинаның сақталу мерзімі 12 ай егер дайындаған мезеттен бастап, құрғақ қараңғы орында +2 ден +8^{0}С дейіңгі температурда сақталу шарттары орындалса.

1.3. Этикеткасыз, шытынаған, құрамында басқа қосындылары бар, сонымен қатар ашылған күні қолданылмаған вакцинаның ампулалары 10 минут аралығында қайнату немесе дезинфекциялаушы ерітінділер арқылы залалсыздандырылады. Вакцинамен ластанған орындар дезинфектанттармен зарарсыздандырылуға тиісті.

2. Вакцинаны пайдалану тәртібі

2.1. Вакцинаны дауалау мақсатында қойдың қылауынан таза емес шаруашылықтарда пайдаланады.

2.2. Вакцинация алдында барлық мал басына ветеринариялық тексеріс жүргізеді және клиникалық дені сау жануарларды вакциндейді.

2.3 Егуге жатады

- Жасы 7-15 тәуліктік бұзау, қозылар, құлындар, торайлар. Вакциндеу 1 мл мөлшерінде бір рет жүргізіледі (400-500 млн. колония түзуші бірлік). Вакцинаны тері астына мойынның ортаңғы үшінші бөлігіне енгізеді.

Ескерту. Бұзаулармен бірге бұзаулаған сиырлар мен торайларды торайлаған мегежіндермен бірге 7-15 тәулік 2 мл мөлшерінде вакциндеу ұсынылады.

Саулықтар ұрықтануға дейін 15-20 күн бұрын немесе 15-20 күннен кейін дауаланады.

Биелер буаздығының 5-7 айлығында дауаланады.

Вакцинация кезінде асептика және антисептика ережесін сақтау қажет.

2.4. Вакциналанған жануарларда иммунитет 1-2 аптадан соң түзіліп 10-12 ай сақталынады.

2.5. Барлық егілген жануарлар 14 күндей аралықта малдәрігердің бақылауында болуы тиісті. Вакцинаны енгізгеннен кейіңгі жануарлар жалпы

реакциясы 4-6 сағаттан соң түзіледі де температураның 0,5-1,0 ^{0}С-ге қысқа мерзімге артқандығы байқалады. Вакцинадан кейінгі бір тәуліктен соң реакция жойылады.

2.6. Вакцинаға байланысты асқынулар болған жағдайда, препараттың осы сериясының пайдаланылуы тоқтатылып және ол жөнінде тез арада бактериозға қарсы биотехнологиялық лабораторияға хабарлау қажет.

Сонымен бір мезетте жоғарыда аталған мекен-жайға вакцинаның үш ампуласы жөнелтіледі.

3. Сақтау және жарамдылық мерзімі

Вакцина сақтау +2+8ºС температурада, қараңғы, құрғақ орында сақтау қажет. Мұздалған күйінде қолданылмайды.

Жарамдылық мерзімі 12 ай.

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

НАСТАВЛЕНИЕ

по применению поливалентной вакцины против сальмонеллеза сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи)

РК-ВП-1-2903-15

1. Общие положения

1.1. Сухая живая поливалентная вакцина против сальмонеллеза сельскохозяйственных животных, состоящую из пяти штаммов-сероваров – Salmonella dublin 12, Salmonella typhimurium – 09, S. abortusovis К-8, S. abortusequi Б-41, Salmonella choleraesuis В-17, по внешнему виду представляет собой мелкопористую массу (таблетку) белого или светло-желтого цвета или же (в случае жидкой формы, готовой к применению) жидкость светло-желтого цвета. Препарат легко суспендируется в физиологическом растворе хлористого натра или кипяченой воде.

1.2. Вакцина расфасована в ампулы. Хранят вакцину в сухом темном месте при температуре от +2 до +10°С.

Срок годности вакцины 1 год со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения.

1.3. Ампулы с вакциной имеющие трещины или содержащие посторонние примеси, при наличии не разбивающихся хлопьев после растворения, а также неиспользованную вакцину в течение 6 часов после разведения обеззараживают путем кипячения в течение 15 минут. Аналогично поступают с ампулами из под вакцины.

2. Порядок применения вакцины

2.1. Вакцину применяют для профилактики сальмонеллеза сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, овцы, лошади, свиньи) в неблагополучных по этой болезни хозяйствах. Лечебными свойствами вакцина не обладает.

2.2. Перед вакцинацией проводят ветеринарный осмотр всего поголовья и вакцинируют только клинически здоровых животных.

2.3. Прививке подлежат

-телята, ягнята, жеребята, поросята в возрасте 7-15 суток. Вакцинация однократная в дозе 1 мл (400-500 млн. колониеобразующих единиц). Вакцину вводят подкожно в области средней трети шеи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется вакцинировать вместе с телятами и поросятами отелившихся коров и опоросившихся свиноматок на 7-15 сутки, в дозе 2 мл (800 млн. К.О.Е.) подкожно.

Овцематки иммунизируются за 15-20 дней до осеменения или 15-20 дней после осеменения.

Кобылы иммунизируются в период 5-7 месяц жеребости.

При вакцинации необходимо соблюдать правила асептики и антисептики.

2.4. Иммунитет у вакцинированных животных наступает через 14 суток и сохраняется в течение 12 месяцев.

2.5. Сухую живую вакцину перед применением разводят стерильным физиологическим раствором или охлажденной кипяченой водой из расчета 1 мл на каждую дозу вакцины.

Например, если в ампуле 20 доз, то содержимое растворяют в 20 мл растворителя.

2.6. Все привитые животные должны находиться под наблюдением ветеринарного специалиста в течение 2-3 часов.

2.7. У отдельных животных могут наблюдаться осложнения (сильная одышка, пенистое истечение из носа, резкая слабость). Они обусловлены не токсичностью вакцины, а повышенной чувствительностью (аллергического характера) животных, которую можно объяснить переболеванием в той или другой стадии сальмонеллезом и другими причинами. Эти осложнения, как правило, бывают в первые минуты после инъекции вакцины.

В случае осложнений следует ввести подкожно или внутривенно раствор кофеина и перевести животное на свежий воздух.

2.8. При появлении поствакцинальных осложнений необходимо исключить другие болезни, сообщить производителю изготовившему вакцину, с указанием серии вакцины и характера осложнений. Одновременно в адрес производителя направить 2-3 ампулы примененной серии вакцины.

3.Хранение и срок годности

Хранение вакцины в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре +2+8ºС. Замораживание не допускается.

Срок годности –12 месяцев со дня выпуска.

Не применять после истечения срока годности.