СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора
Е.А. НЕПОКЛОНОВ
22 ЯНВ 2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гиподектина инъекционного
для борьбы с гиподерматозом, телязиозом, диктиокаулёзом
крупного рогатого скота, эдемагенозом и цефеномиозом северных оленей

(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим»,
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9 , стр. 2)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Гиподектин инъекционный (Hypodektin inj.).
Международное непатентованное название: авермектин.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Гиподектин инъекционный в 100 мл в качестве действующего вещества содержит 0,01% авермектин (22,23-дигидроавермектина $B_{1)}$, а в качестве вспомогательных веществ: изопропиловый спирт и триэтиленгликоль.
3. По внешнему виду Гиподектин инъекционный представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После вскрытия упаковки лекарственный препарат необходимо использовать в течение суток.

Запрещается использовать Гиподектин инъекционный по истечении срока годности.
4. Гиподектин инъекционный выпускают расфасованным по 10, 20, 50, 100, 200 мл в стеклянные или полиэтиленовые флаконы и по 250, 450, 500 мл в бутылки соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы по 10 и 20 мл упаковывают по 1 или 10 штук в картонные коробки или пластиковые блистеры. Каждую единицу фасовки лекарственного препарата сопровождают инструкцией по применению.
5. Хранят Гиподектин инъекционный в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 30°С.
6. Лекарственный препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Гиподектин инъекционный относится противопаразитарным препаратам группы макроциклических лактонов.
10. Авермектин, входящий в состав Гиподектина инъекционного, обладает системным действием на личинок оводов, телязий и возбудителей диктиокаулёза

крупного рогатого скота, а также на личинок оводов северных оленей. Поступая в организм паразита, авермектин стимулирует выделение нервными окончаниями нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты и усиливает её связь с рецепторами нервных клеток, блокируя тем самым прохождение нервных импульсов и вызывая паралич, а затем гибель паразита в организме животного.

После парентерального введения препарата авермектин всасывается и распределяется в органах и тканях животного, обеспечивая длительное противопаразитарное действие. Выводится авермектин из организма с мочой и желчью, у лактирующих животных - также с молоком.

Гиподектин инъекционный по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Гиподектин инъекционный применяют при гиподерматозе, телязиозе и диктиокаулёзе крупного рогатого скота, эдемагенозе и цефеномиозе оленей.

12. Противопоказанием к применению Гиподектина инъекционного является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе).

13. Гиподектин инъекционный вводят крупному рогатому скоту однократно под кожу в область нижней трети шеи: взрослым животным в дозе 3 мл, молодняку до 150 кг - 2 мл; оленям подкожно или внутримышечно массой до 50 кг – 1 мл, более 50 кг – 2 мл.

С целью ранней химиотерапии гиподерматоза и диктиокаулёза обработку крупного рогатого скота проводят осенью в октябре и ноябре, оленей против эдемагеноза и цефеномиоза в зависимости от зоны: в августе, сентябре или октябре. При этом обработке подвергают всё поголовье стада.

Весной (в конце марта – начале апреля) при появлении у крупного рогатого скота на спине свищевых капсул (желваков) с экстенсивностью поражения более 3% обрабатывают всё поголовье, в мае только животных, пораженных личинками. Больным диктиокаулёзом животным Гиподектин инъекционный применяют однократно в июле, августе, сентябре.

С лечебной целью обработку крупного рогатого скота против телязиоза проводят по показаниям: при появлении клинических признаков (гиперемия, конъюнктивы, слёзотечение, серозное или серозно-гнойное выделение, помутнение роговицы, светобоязнь) и (или) обнаружении личинок или молодых телязий в конъюнктивальной полости. С профилактической целью обработку животных проводят перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, тремор, усиленная саливация, отказ от корма.

15. Особенностей действия при первом применении лекарственного препарата и его отмене не установлено.

16. Лекарственный препарат можно применять беременным и лактирующим животным, а также молодняку.

17. Гиподектин инъекционный применяется однократно.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата

и появлении осложнений (избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь), обработку прекращают и назначают средства симптоматической терапии.

19. Гиподектин инъекционный не следует применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других групп отсутствуют.

20. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 5 дней после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко от обработанных животных используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Гиподектином инъекционным следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Гиподектином инъекционным. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.	ООО «Ветбиохим», 355019, г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18.
Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:	ООО «Ветбиохим», 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9 , стр. 2.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает силу Инструкция по применению Гиподектина инъекционного для борьбы с гиподерматозом, диктиокаулёзом крупного рогатого скота и эдемагенозом и цефеномиозом северных оленей, утвержденная Россельхознадзором 14 марта 2012 г.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.12-2370 ~ ПВР-3-3.1/00775