ТОО НПЦ «БИОВЕТ»

РНН 600500049964, KZ 31914398914BCO2255, в ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы, КБЕ 17, БИК SABRKZKA, ИИН/БИН 970640002008, 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай Батыра , 191 литер «А», тел. 8 702 408 11 70, e.mail: biovet.kaz@mail.ru

Конкурсной комиссии

Возражение

Согласно требованиям технической спецификации конкурсной документаций по лоту № 16208000-ОК1 необходимо поставить «Препарат для профилактики гиподерматоза крупного рогатого скота», в 1 мл которого в качестве действующего вещества должен содержаться ивермектин в количестве не менее 0,1 мг. **Препарат поставляется во флаконах объемом 100 мл с содержанием в одном флаконе 33 дозы препарата**. Поставляемый препарат не должен вызывать ограничения по использованию молока дойных коров в пищевых целях (Приложение 2 к конкурсной документации).

Победителем по лоту № 16208000-ОК1 определено ТОО «Ареал-Вет». В Инструкции по применению ветеринарного препарата «Экомектин 1%», который планирует поставить ТОО «Ареал-Вет» указано следующее:

*3.4 Для **профилактики** гиподерматоза у крупного рогатого скота препарат вводят подкожно в области нижней трети шеи. Животным массой 150 кг и более препарат применяют в дозе 0,3-0,5 см^3, молодняку с массой тела до 150 кг - 0,2 см^3.*

Таким образом, в одном флаконе объемом 100 мл, в зависимости от массы животных, содержится от 200 до 500 **профилактических** доз препарата «Экомектин 1%».

В технической спецификации конкурсной документации к данному тендеру четко указано, что один флакон емкостью 100 мл должен содержать 33 дозы.

Если же использовать препарат «Экомектин 1%» для лечения животных с клиническими симптомами (при наличии свищевых капсул) - препарат вводят в дозе 1 см^3 на 50 кг массы тела, то в одном флаконе объемом 100 мл содержится 33 дозы. Однако в этом случае имеются ограничения на использование молока дойных животных в пищевых целях после введения препарата, что указано в пункте 3.10 наставления по применению препарата «Экомектин 1%».

3.10 Убой крупного рогатого скота, овец, лошадей разрешается не ранее, чем через 21 сутки, свиней - через 28 суток после введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока, мясо используют на корм плотоядным животным.

Молоко в пищу людям следует использовать не ранее, чем через 28 суток после последнего применения препарата. До истечения указанного срока молоко скармливают животным после кипячения.

Единственным на рынке препаратом, отвечающим требованиям конкурсной документации, является «Гиподектин инъекционный» для профилактики гиподерматоза КРС с содержанием в одном флаконе объемом 100 мл 33 дозы препарата.

На основании выше изложенного установлено, что в одном 100 мл флаконе поставляемого препарата «Экомектин 1%» содержится от 200 до 500 профилактических доз препарата, что не соответствует требованиям технической документации конкурса, а признание ТОО «Ареал-Вет» победителем конкурса неправомерным.

Директор ТОО НПЦ «БиоВет» Бейсеева А.А.

29.03.2018г.