УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дезконтракт»

«__» 2014 г

_____ А.Б. Кузырев

ИНСТРУКЦИЯ М-1406
по применению жидкого мыла для рук «Sprinter»
(ООО «Дезконтракт», Россия)

г. Москва, 2014 г.

Инструкция по применению М-1406
жидкого мыла для рук «Sprinter»
ООО «Дезконтракт», Россия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Жидкое мыло для рук марки «Sprinter» («Спринтер»): «Sprinter Atlantic», «Sprinter Fitomix», «Sprinter Citrus», «Sprinter Floris» представляет собой готовую к применению гелеобразную жидкость цветом применяемого красителя и с запахом применяемой отдушки.
В качестве моющей основы содержит комплекс мягких ПАВ, диэтаноламид кокосового масла, лауретсульфат натрия, кокамидопропилбетаин, хлорид натрия, лимонная кислота. В качестве ухаживающей за кожей добавки содержит комплекс растительных экстрактов, который оказывает успокаивающее, противовоспалительное, ранозаживляющее действие на кожу, предотвращая сухость и шелушение и глицерин, который уменьшает испарение влаги с поверхности кожи, способствует поддержанию защитной функции кожи.
pH мыла pH 5,5-6,5
Обладает выраженным моющим действием.
После замерзания и последующего оттаивания сохраняет свои свойства.
Срок годности: 5 лет со дня изготовления в плотно закрытой упаковке изготовителя.
Выпускается во флаконах с насос-дозатором (Диспенсопак) на 1,5 мл каждая доза (нажатие) либо крышкой «пуш-пул» объёмом 0,5 л. и 1 л, в евро - флаконах объёмом 1 л для использования в локтевых дозаторах и канистрах по 3 и 5 л.

1.2. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства у средства не выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на оболочки глаз. При ингаляционном воздействии паров в насыщающих концентрациях средство относится к 4 классу мало опасных средств по степени летучести.

1.3. Жидкое мыло для рук «Sprinter» предназначено для:
гигиенической обработки рук перед и после проведения медицинских манипуляций**:**

- медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, медицинские многопрофильные центры, медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, акушерские стационары, диспансеры, стоматологические клиники и отделения, родовспомогательные учреждения, кабинеты диагностики, эндоскопические и колоноскопические отделения, офтальмологические, приемные отделения, смотровые кабинеты, перевязочные, кабинеты амбулаторного приема, детские стационары, отделения неонатологии, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые отделения, станции переливания крови, противотуберкулезные учреждения, кожно-венерологические учреждения и др.); в учреждениях дезинфекционного профиля, включая санпропускники;

- хирургов, оперирующего медицинского персонала, акушерок и других лиц, участвующих в приеме родов перед использованием кожного антисептика (например, «А-ДЕЗ-антисептик»);

- работников лабораторий (в том числе бактериологических, клинических, диагностических и прочих), аптеках и аптечных учреждений;

- в детских дошкольных и школьных учреждениях, учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов, хосписы и т.п.), учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, на объектах курортологии, офисах, кинотеатрах, музеях;

- работников предприятий пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая, кондитерская и др.);

- работников на ветеринарных объектах, птицеводческих, животноводческих, звероводческих хозяйствах;

- работников общественного питания, предприятий продовольственной торговли;

-работников парфюмерно-косметической, химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической промышленности;

- работников и посетителей объектов коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, вокзалы, общественные туалеты, прачечные, парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, бани, бассейны, сауны, спортзалы и др.), в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общественного питания и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые), продовольственных и промышленных рынках;

- персонала пенитенциарных учреждений, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных комплексов;

- сотрудников предприятий розничной торговли;

- представителей силовых ведомств, в т. ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО;

санитарной обработки кожных покровов (в том числе тело, ноги, стопы ног и пр.);

- для применения населением в быту. Может быть использовано для принятия душа и в качестве пены для ванн;

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Гигиеническая обработка рук

Нанести 3-5 мл на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 30 сек. Затем мыло хорошо смыть водой.

2.2. Санитарная обработка кожных покровов, в том числе ступней ног.

Нужное количество средства нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожные покровы, предотвращая попадание средства в глаза. Затем пену хорошо смыть водой.

2.3. Для использования в качестве пены для ванн налить необходимое количество мыла в ванну и взбить под струёй воды до образования обильной пены

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство предназначено только для наружного применения. Запрещается применять во внутрь!

3.2. Не использовать по истечении срока годности.

3.3. Средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание с другими

средствами не допускается.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При попадании средства в глаза следует обильно промыть их проточной водой в течение 10-15 минут, закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия; при необходимости обратиться к врачу.

4.2 При попадании на поврежденную кожу – промыть водой

4.3 При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с адсорбентом (например, 10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды), желудок не промывать. При необходимости обратиться к врачу.

5. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Выпускается во флаконах с насос-дозатором (Диспенсопак) на 1,5мл. каждая доза (нажатие) либо крышкой «пуш-пул» объёмом 0,5л. и 1л, в евро - флаконах объёмом 1 л для использования в локтевых дозаторах и канистрах по 3 и 5л.

5.2 Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.3 Средство хранят в плотно закрытой упаковке производителя на складах вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Температура хранения от -40ºС до плюс 40°С.

5.4 В случае аварийного повреждения упаковок разлитое средство засыпать песком, землей, опилками или другими адсорбирующими веществами, собрать и отправить на утилизацию, остатки смыть большим количеством воды. При ликвидации аварии следует использовать средства индивидуальной защиты - резиновые перчатки, защитные очки.

5.5 Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Показатели качества жидкого мыла «Sprinter»

№ п/п	Наименование показателей	Нормы
1	Внешний вид	гелеобразную жидкость цветом применяемого красителя
2	Запах	запах применяемой отдушки
3	Плотность при 20ºС, г/см^3	1,03 ± 0,03
4	Показатель активности водородных ионов (pH) средства	6,0± 0,5

6.2. **Определение внешнего вида и запаха**

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из бесцветного прозрачного стекла по ГОСТ 25336 – 82 с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.

Запах оценивают органолептически при температуре 20 – 25 ^{0}С.

6.3 **Определение плотности** при 20°С

Плотность средства определяют по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4 **Определение показателя активности водородных ионов (pH)** средства измеряют в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (pH)».