регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", в случае наличия в составе компонента, представляющего собой пищевой продукт, информация о нем должна быть размещена на упаковке в составе продуктов питания, маркировка должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей). У заменителей грудного молока (0-6 месяцев) предлагаемые компанией ТОО «СТОФАРМ», в составе не указаны галактоолигосахариды, а указан пребиотик **олигогалактоза** (олигомеры галактозы), который является только одним из компонентов входящий в состав галактоолигосахаридов. Как известно, в грудном молоке содержится уникальный комплекс именно галактоолигосахаридов, включающий глюкозу, галактозу, олигомеры фукозы, N-ацетилглюкозамин, которые способствуют развитию бифидобактерий и формированию иммунитета новорожденных, поэтому содержание в адаптированных заменителях грудного молока для новорожденных (0-6 месяцев) пребиотического комплекса галактоолигосахаридов, является обязательным, так как они благотворно влияют на организм младенца, стимулируя быстрое размножение бифидобактерий в толстом кишечнике, способствует адсорбции и удалению патогенных микроорганизмов из пищеварительного тракта, влияют на работу иммунной системы, помимо этого, галактоолигосахариды также способствуют лучшему усвоению эссенциальных **(жизненно важных)** элементов, таких как кальций, магний, фосфор, снижают сывороточный холестерин, повышают клеточный иммунитет, а также способствуют синтезу витаминов и витаминподобных веществ B1, B2, B6, B12, никотиновой и фолиевой кислот полезной кишечной флорой. Галактоолигосахариды снижают тяжесть и проявления пищевой аллергии, помогают поддерживать микрофлору кишечного тракта в здоровом состоянии, предохраняя его от инфекций, а также нормализуют кишечную перистальтику.

Во вложении прикреплены фото упаковок, с составом имеющихся на рынке Казахстана детских смесей, где можно увидеть, что качественные адаптированные детские смеси, обязательно имеют в своем составе пребиотик - **галактоолигосахариды.**

2. Продукция компании ТОО «СТОФАРМ», заменители грудного молока (0-6 месяцев), не соответствует требуемой прикрепленной технической спецификации, в части **адаптированности** молочной смеси, а именно белковый компонент заменителей грудного молока предлагаемых компанией ТОО «СТОФАРМ» ниже, чем у некоторых детских смесей предлагаемых другими участниками данного конкурса.

Адаптированная - значит максимально приближенная по своему составу детская молочная смесь, к составу женского грудного молока, по большинству компонентов – **белковому, жировому, углеводному, минеральному, витаминному**, которые соответствуют особенностям пищеварения и метаболизма ребенка первого года жизни, соответственно при выборе заменителей грудного молока, **адаптированность** детских смесей сравнивается по белковому компоненту, а также по содержанию нутриентов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в продукции компании ТОО «СТОФАРМ», соотношение по белковому компоненту, а именно сывороточного белка с казеином, низкое и составляет в % 60:40, в грудном молоке этот показатель равен 90:10, 80:20. Соответственно заменители грудного молока, предлагаемые ТОО «СТОФАРМ», по данному показателю не достаточно адаптированы (приближены) к составу женского грудного молока. Чем выше содержание сывороточных белков, тем лучше это для малыша, сывороточный белок способствует нормализации состава кишечной микрофлоры, снижает риск возникновения запоров, и лучше усваивается, чем казеин. В продукции, предлагаемой нашей компанией, соотношение сывороточного белка с казеином составляет в % 65:35, что соответственно делает наш продукт ближе к составу женского грудного молока, в сравнении с продукцией компании ТОО «СТОФАРМ», и данный показатель обязательно должен быть учтен при выборе **адаптированных** заменителей грудного молока для детей первого полугодия жизни.

Для обеспечения дифференцированного подхода к искусственному вскармливанию грудных детей с учетом особенностей их развития необходимо адекватно оценивать значимость в обменных процессах того или иного нутриента, входящего в состав молочной смеси. Неблагоприятные последствия вскармливания недостаточно адаптированных молочных смесей сопряжены с возникновением ряда рисков: развития железодефицитной